

臺北市政府衛生局 函

10041

台北市中正區青島西路11號3樓

地址：11008臺北市信義區市府路1號

承辦人：廖玲玉

電話：02-27287080

傳真：02-27208779

電子信箱：ivy-liao@health.gov.tw

受文者：臺北市中醫師公會

發文日期：中華民國101年11月29日

發文字號：北市衛醫護字第10155487100號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：為確保民眾就醫安全，請貴院於執行「中醫埋線」業務時，確實依相關感染管制作業規範辦理，請查照。

說明：

- 一、依據行政院衛生署101年11月22日署授藥字第1010005340號函轉民眾致衛生署署長信箱反映事項（如附件1）辦理。
- 二、請貴院於執行侵入性中醫醫療行為時，應確實遵守感染管制相關作業規範，以維護病人安全；另檢附本局訂定「臺北市政府衛生局穴位埋線標準作業規範」（附件2）供參。
- 三、副本抄送本市中醫師公會，惠請轉知並督促會員確實遵行。

正本：臺北市立聯合醫院、行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院、國防醫學院三軍總醫院、臺北醫學大學附設醫院、臺北市立萬芳醫院、振興醫療財團法人振興醫院、中國醫藥大學附設醫院臺北分院、天心中醫醫院、全昌堂傳統中醫醫院

副本：行政院衛生署、臺北市中醫師公會（均含附件）

局長 林奇宏

本案依分層負責規定授權業務主管決行

檔 號：
保存年限：

行政院衛生署 函

地址：10453台北市中山區雙城街6號
承辦人：王彩嫻
電話：(02)2587-2828#275
傳真：(02)2599-5109
電子信箱：tsaiwu@ccmp.gov.tw

受文者：臺北市政府衛生局

發文日期：中華民國101年11月22日
發文字號：署授藥字第1010005340號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(0005340A0B_ATTCH1.pdf)


主旨：為確保民眾就醫安全，請貴局針對轄區內中醫醫療院所執行「中醫埋線」業務之感染管制作業加強查核，請查照。

說明：

- 一、依據民眾致本署署長信箱（影本如附件）辦理。
- 二、副本抄送中醫師公會全國聯合會，請加強宣導會員於執行侵入性中醫醫療行為時，應注意感染管制相關程序，以維病人安全。

正本：臺北市政府衛生局、新北市政府衛生局、基隆市衛生局、桃園縣政府衛生局、新竹市衛生局、新竹縣政府衛生局、苗栗縣政府衛生局、臺中市政府衛生局、彰化縣衛生局、南投縣政府衛生局、雲林縣衛生局、嘉義市政府衛生局、嘉義縣衛生局、臺南市政府衛生局、高雄市政府衛生局、屏東縣政府衛生局、宜蘭縣政府衛生局、花蓮縣衛生局、臺東縣衛生局、連江縣衛生局、金門縣衛生局、澎湖縣政府衛生局

副本：中華民國中醫師公會全國聯合會



衛生局 1011123



AJAA10155487100

衛生署 署長信箱案件回復陳核單

案件編號： 20121115-8705		案件來源： 署長信箱	
提出日期： 2012/11/15	限辦日期： 2012/11/22	已辦理天數： 1	
來信民眾：	電話：	E-mail：	
案件主旨： 中醫埋線業務之衛生安疑義 案件內容： 貴署已有發布對於針灸針無菌性檢測結果之公告 但時下流行之埋線減重或治療，國內並無廠商製作Kit，完全依賴手工將羊腸線剪成小段，穿入針頭再加上針灸針推入，在此一製程中，中醫師有無正確的無菌操作觀念及技術還有相關設備？按常理推論，針灸針刺入穴道頂多留置 20 分鐘，但羊腸線埋入體內會達一至二周，時下流行於仿間之埋線業務是否合乎無菌規範？中醫師是否具有無菌觀念及技術？貴署是否應成立專案小組針對全國執行此業務之中醫院所嚴加查核督導？以免此一業務因中醫師素質低落額最後造成民眾感染或衍生其他問題而最終導致社會對此醫療法產生負面認知而瓦解？希貴署派有感染控制專長之醫師參與此項工作！ 案件附件：			

臺北市府衛生局「穴位埋線」標準作業規範

壹、目的：

應用羊腸線在穴位較持久性的刺激，達到調理臟腑、疏通經絡、調和氣血，促進腸蠕動及通利小便，增進全身性的新陳代謝作用。

貳、適用範圍：肥胖、消化不良、需體質調理等之病人。

參、用物內容：

- | | |
|--------------------|-----|
| (一) 無菌沖洗棉枝 | 2 包 |
| (二) 75%酒精 | 1 罐 |
| (三) 優碘 | 1 罐 |
| (四) 4 號羊腸線 | 1 包 |
| (五) 彎盆 | 1 個 |
| (六) 23#注射針頭 | 8 支 |
| (七) 1.5 吋針灸針 | 8 支 |
| (八) 感染廢棄針筒 | 1 個 |
| (九) 無菌剪刀 | 1 個 |
| (十) 無菌手套 | 1 付 |
| (十一) 無菌無齒鑷子 | 1 把 |
| (十二) 無菌棉球 | 數個 |
| (十三) 透氣紙膠 | 1 個 |

肆、操作步驟與要點原則：

步 驟	要 點 與 原 則
一、埋線前： (一) 洗手。 (二) 核對醫囑；並請病人填寫同意書。 (三) 準備用物。 (四) 核對病人、給予穴位埋線護理指導單張，並說明目的、過程及注意事項。 (五) 圍上圍簾，準備穴位埋線部位及檢查皮膚是否完整。 二、埋線時： (一) 全程依無菌技術原則進行(三消共6支)優碘→75%酒精消毒埋線部位周圍皮膚。 (二) 密切觀察病人反應及給予心理支持。 三、埋線後： (一) 針刺部位用無菌棉球覆蓋予以加壓及透氣膠布固定。 (二) 觀察針刺部位是否疼痛、水腫或血腫。 (三) 移除穴位埋線用物及檢查病人單位，告知病人返家注意事項。 (四) 協助病人起身。 (五) 囑病人於候診區稍事休息5-10分鐘。 (六) 處理用物。 (七) 洗手。 (八) 記錄。	# 依感控規定執行 # 二種以上病人辨識方法 # 給予穴位埋線護理指導單張並說明內容。 # 維護病人隱私及保暖。 # 以優點及75%酒精消毒肚臍周圍皮膚。 # 依感控規定執行。 # 給予病人安全感。 # 注意事項：治療結束後視個人需要喝開水促進代謝及補充水分。 # 依醫療廢棄物處理原則。 # 依感控規定執行。 # 記錄穴位、日期及病人反應。