

中醫嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)診所公告

中華民國中醫師公會全國聯合會(109.1.26 版)

一、 親愛的病患您好，感謝您來本院就診，因應中國爆發的武漢肺炎疫情，下列事項敬請您配合。

二、 **病患防護**：請您配戴外科口罩並定期洗手，或以酒精消毒雙手，當醫師詢問您下列資訊時，請您務必配合詳實回答。

(1) 旅遊史(Travel)：您最近 14 天有無去過大陸地區或是其他國家出遊？

(2) 職業別(Occupation)：您是否從事可能接觸到感染者的工作？例如醫療或照護單位、交通航空業、餐飲百貨業？。

(3) 接觸史(Contact)：您是否曾與發燒或感冒症狀的患者接觸？

(4) 群聚史(Cluster)：您身邊其他人有感冒或發燒症狀嗎？包括家人、朋友、同事等。

三、 **通報治療**：武漢肺炎屬於法定傳染病，我們除了依照中醫學理與診察結果給予積極治療，對於疑似個案依法需要通報防疫專線 1922，由衛生局安排至指定醫院隔離治療。

四、 **通報條件**：

3. 14 天內有湖北旅遊史，且有發燒或呼吸道感染症狀。

4. 14 天內有中國旅遊史，且有肺炎症狀(咳嗽伴有痰液、發熱畏寒、呼吸困難，深呼吸時會胸痛，而且呼吸加快、呼吸困難等)。

五、 以上公告請張貼於診間明顯處，並提醒病患及工作人員。

中華民國中醫師公會全國聯合會

中醫嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)處置建議

中華民國中醫師公會全國聯合會(109.1.26 版)

一、 武漢肺炎病例定義

臨床條件(下列任一項)	流行病學條件，在發病前 14 日
1. 發燒 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) 及急性呼吸道感染。 2. 臨床、放射線診斷或病理學上顯示有肺炎。	1. 曾去過中國湖北省(含武漢地區)，或曾接觸來自該地區且有發燒及呼吸道症狀人士。 2. 曾有中國大陸旅遊史或居住史。 3. 曾經與出現症狀的極可能病例或確定病例有密切接觸，包括在無適當防護下提供照護、相處、或有呼吸道分泌物、體液之直接接觸。
檢驗條件(下列任一項)	
1. 檢體（如咽喉擦拭液、痰液或下呼吸道抽取液）分離並鑑定出新型冠狀病毒。 2. 檢體新型冠狀病毒分子生物學核酸檢測陽性。	

二、 自我防護：建議醫療人員及所有同仁必須配戴口罩，並做好洗手與消毒。

1. 洗手五時機：(1)接觸病人前 (2)接觸病人後 (3)接觸診間 (4)執行侵入性治療前(5)接觸病人體液後。
2. 環境消毒：建議以 75%酒精或 1：100 稀釋的消毒水稀釋消毒診間環境。

三、 病患防護：對於有發燒或感冒症狀的患者，請病患配合配戴外科口罩並以酒精乾洗手消毒雙手，並且詳實詢問臨床症狀、旅遊史與中醫四診。

1. 發燒或感冒必要問診項目(TOCC)
 - (1) 旅遊史(Travel)：於發病前有無去過大陸地區或是其他國家出遊？
 - (2) 職業別(Occupation)：是否從事可能接觸到感染者的工作？例如醫療或照護單位、交通航空業、餐飲百貨業？。
 - (3) 接觸史(Contact)：是否曾與發燒或感冒症狀的患者接觸？
 - (4) 群聚史(Cluster)：身邊其他人有相同症狀嗎？包括家人、朋友、同事等。

四、 通報治療：武漢肺炎屬於法定傳染病，除了依照中醫學理與病患四診給予積極治療，依法需要通報防疫專線 1922，由衛生局安排至指定醫院隔離治療。

五、 通報條件：

1. 14 天內有湖北旅遊史，且有發燒或呼吸道感染症狀。
2. 14 天內有中國旅遊史，且有肺炎症狀(咳嗽伴有痰液、發熱畏寒、呼吸困難，深呼吸時會胸痛，而且呼吸加快、呼吸困難等)。

就醫民衆及陪病家屬 請注意



- 進入醫療院所
務必佩戴口罩



- 就診時務必主動告知
發病前14日內之
旅遊史、職業別、
接觸史以及是否
群聚 (TOCC)

製作日期:2020/01/25

武漢肺炎疫情 最新資訊這裡找

- ◆ 疾病管制署全球資訊網
「嚴重特殊傳染性肺炎」專區
- ◆ Youtube搜尋疾病管制署，
每日上傳疫情記者會直播影片

中央流行疫情指揮中心設立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由指揮中心統一對外公布。民衆接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。

中央流行疫情指揮中心

TAIWAN CDC
2020/01/25 廣告

嚴重特殊傳染性肺炎與嚴重急性 呼吸道症候群比較表

疾病名稱	嚴重特殊傳染性肺炎 (Severe pneumonia with novel pathogens)	嚴重急性呼吸道症候群 (SARS)
致病源 (病毒)	新型冠狀病毒 (2019-nCoV)	SARS冠狀病毒 (SARS-CoV)
傳染方式	有限人傳人風險，傳染方式可能 為近距離飛沫傳染、接觸傳染(直接 或間接)、動物接觸感染(待釐清)	近距離飛沫傳染、 接觸傳染(直接或間接)
潛伏期	14天內	約2至7天 (最長至10天)
可傳染期	未知	發病後10天內 (發病前不具有傳染力)
動物宿主	未知	可能為果子狸、蝙蝠、 麝香貓等
主要 流行地區	中國大陸武漢市	中國大陸東南地區
臨床症狀	發燒、四肢無力、部分咳嗽、 少痰，少數患者伴隨病程進展 出現呼吸困難	發燒、咳嗽，部分伴隨頭痛、 倦怠、腸胃道症狀等， 可能併發呼吸困難或急促